

Clinic Cava

Patientinformation til behandling med ikke-permanente Fillers:

Restylane/Profilo/Ejal40/Vitaran

Ikke-permanent filler

En ikke-permanent filler er en gel, som består af hyaluronsyre – det samme stof, som naturligt findes i kroppens bindevæv. Med alderen falder hudens indhold af hyaluronsyre, hvilket kan føre til tab af fasthed og elasticitet.

Når geléen injiceres i hudens rynker, linjer eller folder, tilføjer den volumen, hvilket udglatter huden og giver et mere spændstigt udseende. Filleren smelter sammen med det omkringliggende væv, og da huden kontinuerligt omsætter hyaluronsyre, vil effekten gradvist aftage over tid.

Ikke-permanente fillers anvendes til at reducere rynker og folder, forme ansigtets konturer, give fylde til læber og genoprette hudens elasticitet. De kan også udjævne ujævnheder i hudens overflade. Resultatet af behandlingen varer længe, men er ikke permanent. Effektens varighed afhænger af hudens struktur, alder, livsstil og genetiske faktorer. Generelt kan man forvente, at effekten varer 6–12 måneder i huden og 3–6 måneder i læberne.

Ofte kræver ønskede resultater flere behandlinger, og da de fleste mennesker har en vis asymmetri i ansigtet, kan det være nødvendigt med flere sessioner for at opnå balance og symmetri. I nogle tilfælde anbefales en opfølgende behandling efter 4–6 uger for at justere volumen, korrigere eventuelle asymmetrier eller finpudse resultatet.

Almindelige reaktioner efter behandlingen

Umiddelbart efter behandlingen kan det behandlede område være let rødt, ømt, hævet eller kløende. Der kan også forekomme små blå mærker. Disse symptomer er normalt midlertidige og forsvinder som regel inden for få dage, men blå mærker kan i nogle tilfælde vare op til en uge.

Ved behandling af læber kan hævelsen vare et par dage, og hos enkelte personer kan den strække sig til omkring en uge. Læberne kan i denne periode fremstå lidt ujævne, hvilket betyder, at det endelige resultat først ses, når hævelsen har lagt sig. Nogle patienter har haft gavn af håndkøbs-antihistaminer for at mindske ubehaget.

Mulige komplikationer

Selvom komplikationer er sjældne, kan der i enkelte tilfælde forekomme:

- Let til moderat inflammation, som kan opstå dage eller uger efter behandlingen.
- Langvarig hævelse, pusdannelse eller grålig misfarvning omkring det behandlede område.
- Sårskorper eller dødt væv, som kan resultere i mindre overfladiske ar.
- Ved behandling under øjnene kan hævelse vare længere end forventet.

- Betændelsesreaktioner, der først viser sig 1–2 måneder efter indgrebet.
- Dyb rød misfarvning, der kan sprede sig ud over næseområdet.

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret alvorlige komplikationer på verdensplan, herunder blindhed. Indsprøjtning direkte i et blodkar kan også medføre blokering af blodforsyningen til det behandlede område. Klinikken behandlere er uddannet til hurtigt at håndtere sådanne situationer.

Hvis du oplever nogen af ovenstående komplikationer, eller har andre bekymringer efter behandlingen, er det vigtigt at kontakte klinikken straks via akuttelefonen. Hurtig indsats øger muligheden for et godt resultat.

Det er muligt at opløse filler med hyalase, hvis der opstår et uønsket resultat. Afhængig af situationen kan flere behandlinger være nødvendige for fuld opløsning. Ved behandling på anden klinik kan vi ikke garantere, at opløsning kan foretages.

Gravide og ammende må ikke modtage fillerbehandling.

AKUT telefon

Klinikken kan kontaktes på telefon 60 63 89 14 i åbningstiden. Ved akutte eller alvorlige tilfælde kan du ringe til vores akuttelefon på 28 69 79 82

Vigtige råd efter behandlingen

- Undgå store temperaturændringer de første par dage, såsom solarium, sauna, dampbad eller hård fysisk træning den første dag.
- Rør ikke ved de behandlede områder de første 6–8 timer for at reducere risikoen for infektion.
- Påfør ikke makeup samme dag som behandlingen.
- Hvis du tager medicin indeholdende acetylsalicylsyre (fx Kodimagnyl, Hjertemagnyl eller Treo), kan du have større risiko for blå mærker. Det anbefales også at holde pause med fiskeolie et par dage før og efter behandlingen.
- Har du tidligere haft forkølelsessår, kan behandlingen udløse et nyt udbrud. I så fald anbefales Valaciclovir-tabletter, som kan fås på recept hos egen læge.

For øvrige spørgsmål kan klinikken kontaktes i almindelig åbningstid på **60 63 89 14**.

Information

Jeg har modtaget information om virkningen, mulige reaktioner, bivirkninger og sjældne komplikationer i forbindelse med behandling med ikke-permanente fillerprodukter. Min behandler har givet mig mulighed for at stille spørgsmål, og jeg har haft mulighed for at have en bisidder til stede under konsultationen.

Jeg har fået fyldestgørende svar på mine spørgsmål og har haft en betænkningstid på 2 døgn inden behandlingen.

(Udarbejdet af Clinic Cava, MBB – Version 1.0. Revideret 01.11.2025. Næste revision 01.11.2026)